



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II"
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Dipartimento di Endocrinologia ed Oncologia Molecolare e Clinica

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

DIPARTIMENTO DI ENDOCRINOLOGIA ED ONCOLOGIA MOLECOLARE

Prot. 2011/ 0049712

del 02/05/2011 n. 143



Università degli Studi di Napoli
"Federico II"

Polo delle Scienze e delle
Tecnologie per la Vita

Ufficio Ricerca

Sede centrale

Oggetto: Risultati delle attività di ricerca anno 2010

In esito alla nota di Codesto Ufficio prot. 47051 del 21/04/2011 si comunicano i dati richiesti:

1. Numero progetti di ricerca in corso con fonte di finanziamento: 19
2. Numero di convenzioni e accordi di ricerca: 66
3. Numero scuole di specializzazione: 3 (Scuola di Specializzazione in Oncologia, Scuola di Specializzazione di Endocrinologia e Malattia del Ricambio, Scuola di Specializzazione di Chirurgia dell'Apparato Digerente ed Endoscopia digestiva Chirurgica).

Si trasmette, altresì, un elenco contenente la descrizione delle convenzioni e accordi di ricerca di cui al punto 2.

Il Direttore
Prof. Gaetano Lombardi

SOCIETA'	TITOLO	RESPONSABILE
Amgen Dompè	Primaria: studio osservazionale prospettico di tipo descrittivo sull'uso di Mimpara in pazienti affetti da iperparatiroidismo primario nella pratica clinica	Colao
Amgen Dompè	Consulenza	Colao
Beaufour Ipsen Pharma	Multi-centre trial phase III, being a randomised, double blind, stratified, comparative, placebo controlled parallel group trial capable of assessing the effects of deep subcutaneous injections of lanreotide auto gel of 120mg given every 28 days on the survival, without the tumour progressing of patients suffering from non-functioning endocrine entero pancreatic tumours	Colao
Fondazione SDN	Consulenza	Colao
GB Pharma Services & Consulting	Nordinet International Outcome study	Colao
Genzyme S.r.l.	Evaluation of bone abnormalities in patients with fabry disease	Colao
Icon Clinical Research LTD	Studio multicentrico non comparativo di fase II, in aperto, randomizzato, a gruppi paralleli, per valutare l'efficacia e la sicurezza della somministrazione sottocutanea (s.c.) ripetuta di diverse dosi di BIM 23 ^o 760 in pazienti acromegalici	Colao
Icon Clinical Research LTD	The global hypopituitary control and complications study (HypoCCS)	Colao
Igenix International S.r.l.	Studio di estensione in aperto di lanreotide Autogel 120mg nei pazienti affetti da tumour endocrine enteropancreatico non funzionante	Colao
Ipsen Pharma Sas	Phase IIIb, multicentre, open-label, single-arm, study to assess the efficacy and safety profiles of Lanreotide Autogel 120mg every 28 days as primary medical treatment in acromegalic patients with macroadenoma	Colao
Ipsen Pharma S.p.A.	International cooperative metabolic study (INCMS) of NutropinAq replacement therapy in adults with growth hormone deficiency	Colao

Novartis Farma S.p.A.	Studio multicentrico, randomizzato, in cieco, per valutare la sicurezza e l'efficacia di pasireotide LAR in confronto a octreotide LAR in pazienti con acromegalia in fase attiva	Colao
Novartis Farma S.p.A.	A randomized, double-blind study to assess the safety and efficacy of different dose levels of Pasireotide (SOM230) s.c. over a 6 month treatment period in patients with de novo, persistent or recurrent cushing's disease	Colao
Novartis Farma S.p.A.	Data Management	Colao
Novartis Farma S.p.A.	Studio randomizzato, multicentrico, in aperto, per confrontare l'efficacia e la sicurezza del trattamento medico con Sandostatina LAR 30 mg somministrata ogni 21 giorni per 6 mesi in pazienti con acromegalia non controllata	Colao
Parexel International S.r.l.	An open-label, two-steps, multicenter European study to evaluate the efficacy and safety of Sandostatin LAR at high dose or in combination either with GH-receptor antagonist or dopamine-agonist in acromegalic patients not adequately controlled by conventional regimen	Colao
Parexel International S.r.l.	A double-blind, randomized phase III study evaluating the efficacy and safety of sorafenib compared to placebo in locally advanced/metastatic RAI-Refractory differentiated thyroid cancer	Colao
Parexel International S.r.l.	A double-blind, randomized phase III study evaluating the efficacy and safety of sorafenib compared to placebo in locally advanced/metastatic RAI-Refractory differentiated thyroid cancer	Colao
Pfizer Italia	Acrostudy A multicenter, post marketing surveillance study of somavert therapy in patients with acromegaly in the US and Europe	Colao
Roche	Effetti dell'orlistat sulla secrezione del GH basale e dopo stimolo con GHRH + Arginina e sulla lipemia postprandiale in pazienti obesi	Colao

Roche S.p.A.	A randomised phase III clinical study of bevacizumab plus capecitabine vs. bevacizumab alone as maintenance therapy in patients with HER2-negative metastatic breast cancer that has not progressed during first-line docetaxel plus bevacizumab	De Laurentiis/De Placido
Boehringer Ingelheim Italia	An open label, randomised, phase III trial of BIBW 2992 and vinorelbine versus trastuzumab and vinorelbine in patients with metastatic HER2-overexpressing breast cancer failing one prior trastuzumab treatment	De Placido
Cancer International Research Group (Quintiles)	Sperimentazione di fase III, multicentrica e randomizzata sulla terapia adiuvante, con confronto tra chemioterapia più Trastuzumab e chemioterapia più Trastuzumab più Bevacizumab, in pazienti con carcinoma mammario HER2-positivo linfonodo-positivo o linfonodo-negativo ad alto rischio	De Placido
Bristol Myers Squibb	Studio randomizzato di fase II con ixabepilone in monoterapia e ixabepilone in combinazione con cetuximab nel trattamento di prima linea di donne affette da tumore della mammella localmente avanzato non operabile e/o metastatico triplo negativo	De Placido
Cephalon France	Studio prospettico, randomizzato e in aperto dell'associazione Myocet più ciclofosfamide e Trastuzumab rispetto all'associazione doxorubicina libera più la sola ciclofosfamide, ciascuna seguita da Docetaxel e Trastuzumab, come terapia neoadiuvante per il trattamento di pazienti naive al trattamento con carcinoma mammario HER2-positivo	De Placido
Consorzio Oncotech	A phase I-II study of the combination of bevacizumab (rhMAB VEGF) and erlotinib (EGFR TKI) plus oxaliplatin and capecitabine (XELOX) in patients with metastatic colorectal cancer: XELOX-TARAV study	De Placido
Consorzio Oncotech	Letrozole adjuvant therapy duration (LEAD) study: standard versus long treatment. A phase III study in postmenopausal women with early breast cancer	De Placido

Consorzio Oncotech	Letrozole adjuvant therapy after Tamoxifen. Study of gene CYP19 correlation with letrozole efficacy in postmenopausal early breast cancer patients	De Placido
Consorzio Oncotech	A randomised trial with factorial design comparing fulvestrant + lapatinid + aromatase inhibitor in metastatic breast cancer progressing after aromatase inhibitor therapy	De Placido
Consorzio Oncotech	Sunitinib either before or after cytoreductive nephrectomy a phase II trial in patients with metastatic renal cell carcinoma	De Placido
Consorzio Oncotech	A feasibility study of dose-dense FEC with G-CSF support followed by dose-dense ixabepilone with G-CSF support as neoadjuvant chemotherapy in ER-negative breast cancer	De Placido
Consorzio Oncotech	Medical optimization of TORisel (MoTOR): multicenter, phase II evaluation of torisel as II-line treatment for metastatic RCC patients progressing after cytokine therapy, tyrosine kinase, or angiogenesis inhibitors	De Placido
ICON	A randomized phase 3 trial of Gemzar and Docetaxel versus Gemzar and Paclitaxel in patients with metastatic breast cancer: a comparison of different schedules	De Placido
Istituto Nazionale per lo Studio e La Cura dei Tumori - PASCALF	A randomized phase II study of carboplatin and paclitaxel +/- cetuximab, in advanced and/or recurrent cervical cancer	De Placido
Kell S.r.l.	Telesal	De Placido
Kendle International S.r.l.	Studio Europeo in aperto multicentrico sul dolore episodico intenso causato dal cancro: valutazione della titolazione e della cura con Fentanyl compresse orali in pazienti tolleranti agli oppioidi	De Placido
Novartis Farma S.p.A.	A multi-center, open label phase II trial of TKI258 in EGFR1 amplified and non-amplified metastatic HER2 negative breast cancer	De Placido
Novartis Farma S.p.A.	A prospective, randomized, multi-center comparative 2-arm trial on efficacy and safety of zoledronic acid 4 mg beyond approximately 1 year of treatment with zoledronic acid in patients with bone lesions from breast cancer	De Placido

Opis S.r.l.	Studio di fase III per valutare l'efficacia e la sicurezza della monoterapia con Pazopanib verso placebo in pazienti senza progressione della malattia dopo chemioterapia di prima linea per carcinoma epiteliale ovarico, carcinoma tubarico o carcinoma peritonelae primario	De Placido
Opis S.r.l.	A phase Ib, open-label, two arm study of i.v. and oral panobinostat (LBH589) in combination with i.v. trastuzumab (Herceptin) and i.v. paclitaxel as treatment for adult female patients with HER2 overexpressing metastatic breast cancer (MBC)	De Placido
Opis S.r.l.	An open-label, multi-center, expanded access study of RAD001 in patients with metastatic carcinoma of the kidney who are intolerant of or have progressed despite any available vascular endothelial growth factor receptor tyrosine kinase inhibitor therapy	De Placido
Opis S.r.l.	Multicenter, case-control, observational study, on the epidemiology and risk factors for thromboembolic events in cancer patients and on the influence of VTE on patient outcome	De Placido
QBGGroup	Carboplatino/paclitaxel vs carboplatino/doxorubicina liposomiale stealth in pazienti con carcinoma ovario: studio multicentrico randomizzato MITO-2	De Placido
Quintiles	Uno studio osservazionale degli eventi cardiaci in pazienti con carcinoma mammario in fase precoce HR2 positivo trattato con Herceptin	De Placido
Roche	Studio in aperto con bevacizumab (Avastin) in combinazione con un tassano, somministrato in monoterapia o in combinazione, per il trattamento di prima linea di pazienti con carcinoma mammario metastatico o con ricaduta loco-regionale	De Placido

Roche S.p.A.	Studio randomizzato, multicentrico di fase III, in aperto, per valutare l'efficacia e la sicurezza di trastuzumab-MCC-DM1 (RO5304020) verso capecitabina in combinazione con lapatinib in pazienti con carcinoma della mammella HER2-positivo, localmente avanzato o metastatico, che hanno ricevuto una precedente terapia con trastuzumab	De Placido
Roche	Studio in aperto di fase II di terapia neoadiuvante con bevacizumab in pazienti con carcinoma mammario infiammatorio o localmente avanzato	De Placido
Roche	A phase III randomized trial of trastuzumab (Herceptin) continuation vs discontinuation in combination with 2 nd-line chemotherapy after progression on a 1st-line trastuzumab chemotherapy combination for HER2 overexpressing metastatic breast cancer patients	De Placido
Roche S.p.A.	A randomized three arm multi-centre comparison of 1 year and 2 year of Herceptin versus no Herceptin in women with her-2 positive primary breast cancer who have completed adjuvant chemotherapy	De Placido/Bianco
Roche (Medidata)	Studio osservazionale per la valutazione dei cambiamenti nel trattamento di prima linea nella normale pratica clinica ai pazienti con tumore metastatico della mammella	De Placido
Schering-Plough S.p.A.	Temozolomide in metastatic breast cancer patients at high risk of brain recurrence: impact on the incidence of brain metastases	De Placido
Teva Italia	A randomized phase 3 study comparing standard first-line docetaxel/prednisone to docetaxel/prednisone in combination with custirsen (OGX-011) in men with metastatic castrate resistant prostate cancer	De Placido

Villa Julie	Training di istruzione e formazione permanente del personale dipendente sanitario e parasanitario nel campo dell'assistenza infermieristica, del trattamento medico chirurgico delle principali patologie neoplastiche e non dell'apparato digerente e delle ghiandole endocrine	Lobello
Hippocrates Research S.r.l.	Adherence to PTH treatments in Italy. A non-interventional cohort study collecting safety information and examining reasons and predictors for adherence to PTH treatments in Usual Clinical Settings	Lombardi
Icon Clinical Research	An Italian observational study to evaluate fracture outcome, compliance to treatment, back pain, healthrelated quality of life, in patients with severe osteoporosis treated according to common clinical practice	Lombardi
Janssen-Cilag S.p.A.	A prospective, observational study of men with premature ejaculation who are treated with Priligy or Alternate care	Lombardi
Laboratoire HRA Pharma	Studio prospettivo, a trattamento noto, multicentrico, internazionale sul mifepristone per il trattamento sintomatico della sindrome di Cushing causata dalla secrezione di ormone adrenocorticotropo (ACTH) ectopico (Fase II/III)	Lombardi
Sandoz Biopharmaceuticals S.p.A.	Post-marketing surveillance to monitor the long-term safety and efficacy of Omnitrope in the treatment of adult	Lombardi
Amgen Dompè	Prevalenza di anemia e pratiche di trattamento nei soggetti affetti da tumori non mieloidi sottoposti a chemioterapia	Palmieri
Villa Julie	Training di istruzione e formazione permanente del personale dipendente sanitario e parasanitario nel campo dell'assistenza infermieristica, del trattamento medico chirurgico delle principali patologie neoplastiche e non dell'apparato digerente e delle ghiandole endocrine	Palmieri

GlaxoSmithKline	Studio randomizzato, in doppio cieco, controllato verso placebo, multicentrico, di fase III sulla terapia adiuvante con Lapatinib o placebo somministrata in associazione a radioterapia e carcinoma a cellula squamosa della testa e del collo (SCCHN) dopo resezione chirurgica	Pepe
PPD Italy S.r.l.	Studio internazionale, randomizzato, in doppio cieco, di fase 3, sull'efficacia di XL184 rispetto al placebo in pazienti con carcinoma midollare della tiroide non operabile, localmente avanzato o metastatico	Salvatore
Astrazeneca	An international, phase II, randomised, double-blinded, placebo-controlled, multi-centre study to assess the efficacy of ZD6474 (zactima) versus placebo in subjects with unresectable, locally advanced or metastatic medullary thyroid cancer	Salvatore
Novartis Farma S.p.A.	A phase III, randomized, double-blind, placebo-controlled multicenter study of ASA404 in combination with docetaxel in second-line treatment of patients with locally advanced or metastatic (stage IIIB/IV) non-small cell lung cancer (NSCLC)	Tortora
Parexel International S.r.l.	Open label, randomized, controlled, multicenter phase III study investigating cetuximab in combination with capecitabine (Xeloda, X) and cisplatin (P) versus XP alone as first-line treatment for subjects with advanced gastric adenocarcinoma including adenocarcinoma of the gastroesophageal junction	Tortora
PPD Italy S.r.l.	Studio di fase II, multicentrico, in aperto, a braccio singolo per valutare la sicurezza e l'efficacia di E7080 orale nel carcinoma midollare e iodio-131 refrattario, non operabile e differenziato della tiroide, stratificato istologicamente	Salvatore